


Manual Prático de Coleta de Amostras de Medula Óssea



Ordem Recomendada de Coleta

1. MIELOGRAMA

- 6 lâminas de esfregaço;
- Encaminhar **hemograma**
- **Identificar:** nome + **sobrenome** (NÃO usar iniciais / NÃO enviar sem identificação);
- Acondicionar no papelote → **recipiente rígido.**




NÃO SECAR



NÃO EXPOR AO FORMOL



NÃO REFRIGERAR



2. IMUNOFENOTIPAGEM

- Aspirar **1 a 2 mL** de medula óssea;
- Acondicionar em **tubo EDTA** (tampa roxa);
- Enviar **2 lâminas adicionais**, caso não haja coleta simultânea de mielograma;
- Manter refrigerado entre **2 °C e 8 °C** até o envio.



3. CARIÓTIPO / FISH

- Aspirar **4 mL** de medula óssea;
- Acondicionar em tubo com **heparina sódica** (tampa verde), **sem gel separador**;
- Manter refrigerado entre **2 °C e 8 °C** até o envio.




4. TESTES MOLECULARES

- Consultar **site da Flow** para mais informações;
- Mínimo **2 tubos** (variável por exame);
- Tubo **EDTA** (roxo);
- Refrigerar (**2-8 °C**).



Consultar site da Flow para mais informações sobre a coleta do exame molecular.




Manual Prático de Coleta de Amostras de Medula Óssea

Ordem recomendada de coleta

1 MIELOGRAMA

- Enviar 6 lâminas (esfregaço)
- Enviar o resultado do hemograma
- Identificar: nome + sobrenome
(**NÃO usar iniciais/ NÃO enviar sem identificação**)
- Lacrar o papelote com a etiqueta de identificação do paciente
- Acondicionar em papelote fornecido no kit e inserir no pote forte



2 IMUNOFENOTIPAGEM

- Aspirar 1 a 2 mL de medula óssea e acondicionar em **tubo EDTA** (tampa roxa)
- Enviar 2 lâminas (nos casos em que não houver coleta simultânea de Mielograma)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit



3 CARIÓTIPO / FISH

- Aspirar 4mL de medula óssea e acondicionar em **tubo com heparina sódica sem gel** (tampa verde)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit




4 TESTES MOLECULARES

- Mínimo 2 tubos (**variável por exame**)
- **Tubo EDTA** (roxo)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit



Consultar o site da Flow para orientações específicas de exames moleculares.




Manual Prático de Coleta de Amostras de Medula Óssea

Ordem recomendada de coleta

1 MIELOGRAMA

- Enviar 6 lâminas (esfregaço)
- Enviar o resultado do hemograma
- Identificar: nome + sobrenome
(**NÃO usar iniciais/ NÃO enviar sem identificação**)
- Lacrar o papelote com a etiqueta de identificação do paciente
- Acondicionar em papelote fornecido no kit e inserir no pote forte



2 IMUNOFENOTIPAGEM

- Aspirar 1 a 2 mL de medula óssea e acondicionar em **tubo EDTA** (tampa roxa)
- Enviar 2 lâminas (nos casos em que não houver coleta simultânea de Mielograma)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit



3 CARIÓTIPO / FISH

- Aspirar 4mL de medula óssea e acondicionar em **tubo com heparina sódica sem gel** (tampa verde)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit




4 TESTES MOLECULARES

- Mínimo 2 tubos (**variável por exame**)
- **Tubo EDTA** (roxo)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit



Consultar o site da Flow para orientações específicas de exames moleculares.



Manual Prático de Coleta de Amostras de Medula Óssea

Ordem de Coleta Recomendada

1.	2.	3.	4.
Mielograma	Imunofenotipagem	Cariótipo/Fish	Moleculares

① MIELOGRAMA

- Enviar 6 lâminas (esfregaço)
- Enviar o resultado do hemograma
- Identificar: nome + sobrenome
- (NÃO usar iniciais/ NÃO enviar sem identificação)
- Lacrar o papelote com a etiqueta de identificação do paciente
- Acondicionar em papelote fornecido no kit e inserir no pote forte

② IMUNOFENOTIPAGEM

- Aspirar 1 a 2 mL de medula óssea e acondicionar em tubo EDTA (tampa roxa)
- Enviar 2 lâminas (nos casos em que não houver coleta simultânea de Mielograma)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit

③ CARIÓTIPO/FISH

- Aspirar 4mL de medula óssea e acondicionar em tubo com heparina sódica sem gel (tampa verde)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit

④ MOLECULARES

- Mínimo 2 tubos (variável por exame)
- Tubo EDTA (roxo)
- Manter refrigerado (2 a 8°C) até acondicionamento no kit

Consultar o site da Flow para orientações específicas de exames moleculares.